ED Col

OCT 3 0 1929

EN VENTE CHEZ L'AUTEUR

(Prix du présent fascicule : 2 fr.)

42,896

MÉLANGES EXOTICO-ENTOMOLOGIQUES

LIBRARY
OF ENTOMOLOGY,
CAMBRIDGE, MASS.

ONZIÈME FASCICULE

(25 novembre 1914)

PAR

MAURICE PIC

OFFICIER D'INSTRUCTION PUBLIQUE
CHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLE
DIRECTEUR DE L'« ÉCHANGE »
CORRESPONDANT DU MUSÉUM DE PARIS
MEMBRE DE NOMBREUSES SOCIÉTÉS SCIENTIFIQUES
DE FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

MOULINS
IMPRIMERIE ÉTIENNE AUCLAIRE
ANCIENNE MAISON C. DESROSIERS

1914

Tous droits réservés

LIBRARY
MUS. COMP. ZOÖLOGY,
CAMBRIDGE, MASS.

INTRODUCTION

Le présent fascicule suit de très près le précédent et personne ne me fera grief, je l'espère, de cette nouvelle contribution scientifique publiée à une époque où beaucoup de travaux sont entravés, ou arrêtés, par les cruelles nécessités des heures sombres que nous traversons. Les raisons de publication invoquées pour le fascicule X peuvent aussi s'appliquer à celui-ci. A quelques descriptions anciennement rédigées et restées *in litteris*, sont venues s'ajouter un certain nombre d'autres nouvelles, conséquence du classement récent de plusieurs boîtes, ou de l'étude de nouveaux insectes intercalés dans ma collection, travail que l'absence momentanée d'envois à déterminer m'a permis enfin de réaliser.

J'ai écrit ce nouveau fascicule avec l'idée de répondre à l'esprit destructif de certains cerveaux par une publication nettement créatrice.

Décrire de nombreuses nouveautés d'une collection française, dans une publication complètement française : voilà la riposte d'un entomologiste, ayant des idées larges, à l'orgueilleuse et étroite *Kultur* scientifique.

***

Nota. — Toutes les nouveautés décrites dans le fascicule XI font partie de ma collection.

30 octobre 1914.

NOUVEAU GENRE, ESPÈCES ET VARIÉTÉS NOUVELLES

DE DIVERSES FAMILLES

Malthinocantharis n. gen. (Malacodermes). *Cantharis* L. vicinus sed ♂ abdomine elongato, apice lobato, pygidio prominulo, sinuato et inciso, elytris mediocre abbreviatis facile distinguendus.

Ce nouveau genre, par les ailes cachées sous les élytres, le prothorax transversal (cet organe est un peu rétréci en avant et arrondi aux angles antérieurs, fortement sinué postérieurement) ou la tête courte, non rétrécie derrière les yeux, se distingue, à première vue, des divers genres de *Malthinini* et du genre *Cantharis* L., dont il a certains caractères communs ainsi que le faciès, par les élytres, quoique longs, dépassés par les 2 ou 3 derniers segments de l'abdomen ; le pygidium chez ♂ est saillant, sinué au sommet, entaillé sur les côtés et bilobé en dessous avant l'extrémité.

Malthinocantharis impressa n. sp. Angustatus, subnitidus, niger, thorace lateraliter late testaceo, abdomine pro parte testaceo.

Allongé, peu brillant, orné d'une fine pubescence grise, noir avec le prothorax largement testacé sur les côtés et l'abdomen en partie de cette dernière coloration. Tête courte, engagée dans le prothorax ; antennes longues et robustes, à 2e article court avec au moins les derniers articles longitudinalement sillonnés ; prothorax transversal, un peu relevé sur le pourtour, subarqué en avant, nettement sinué postérieurement, subarrondis séparément au sommet, non dépassés par les ailes, marqués derrière l'écusson, sur la suture, d'une impression allongée ; abdomen et pygidium débordant nettement les élytres, dernier segment ventral lobé, l'avant-dernier dorsal assez long, pygidium particulier, sinué au sommet, entaillé sur les côtés ; pattes moyennes, ongles des tarses non fendus. Long. 7,5-8 mill. Brésil.

Luciola notaticollis n. sp. Angustatus, parallelus, fere opacus, niger, thorace rufo maculato, elytris testaceis, apice late nigris, abdomine apice albido.

Etroit, parallèle, presque mat, densément ponctué-granuleux sur le prothorax et les élytres, noir avec le prothorax orné, sur le disque en arrière, de plusieurs petites macules rousses, élytres testacés avec environ la moitié apicale noire. Tête creusée entre les yeux ; antennes assez longues, atténuées à l'extrémité, très pileuses ; prothorax transversal, presque droit sur les côtés, à angles postérieurs droits, impressionné transversalement devant la base ; élytres à peine plus larges que le prothorax, parallèles, déprimés, ornés de faibles côtes discales et d'une latérale saillante ; abdomen noir avec les derniers segments blancs. Long. 7 mill. Indes.

Voisin de *L. nigripes* Gorh. et très distinct par sa coloration.

Ptilinus senegalensis n. sp. Elongatus, parallelus, subconvexus, fere opacus et densissime granulatus, griseo pubescens, rufus, oculis nigris, his maximis.

Allongé, parallèle, subconvexe, à ponctuation granuleuse, fine et dense et pubescence grise fine, assez dense, roux, membres compris, avec les yeux noirs, ceux-ci grands. Antennes longuement flabellées chez ♂ ; prothorax transversal, rétréci en avant, presque droit sur les côtés postérieurs, peu convexe ; élytres de la largeur du prothorax, longs, courtement rétrécis au sommet, ayant des traces de stries et de vagues points larges. Long. 4 à 5 mill. Sénégal.

Sans doute voisin de *P. cylindripennis* Wol., qui ne m'est connu que par la description, mais le prothorax paraît être différent et moins convexe ; distinct de *P. truncaticeps* Pic, par la tête dépourvue de ligne élevée sur le vertex avec les yeux moins gros et le prothorax plus droit sur les côtés postérieurs.

Zonitis Fortuccii v. nov. **testaceonotata.** Elytris nigris, in medio et lateraliter late testaceo maculatis.

Se distingue de la forme type par la coloration noire plus

étendue sur les élytres, la suture étant assez largement noire au milieu de ces organes. Mongolie.

Zonitis bilineatithorax n. sp. Elongatus, supra fere opacus et testaceus, capite thoraceque nigro notatis, infra subnitidus, nigro-piceus, pectore lateraliter testaceo, antennis pedibusque nigris, femoribus pro parte rufescentibus.

Allongé, presque mat en dessus, sauf l'avant-corps qui est un peu brillant, testacé pâle avec la tête maculée de foncé et le prothorax orné de deux bandes longitudinales noires, dessous un peu brillant, noir avec les côtés de la poitrine testacés, antennes et pattes foncées, ces dernières ayant les cuisses un peu roussâtres. Tête un peu élargie derrière les yeux et subtronquée postérieurement, fortement et densément ponctuée ainsi que le prothorax, celui-ci assez court, subarqué sur les côtés et un peu rétréci en avant, sillonné sur le disque ; élytres un peu plus larges que le prothorax, progressivement atténués en arrière, pas très longs, très densément ponctués ; pattes assez robustes. Long. 11 mill. Guatemala.

Voisin de *Z. nigromaculata* Champ. et distinct, à première vue, par les élytres immaculés.

Nemognatha nigronotata n. sp. Satis latus, nitidus, testaceus, oculis, antennis, geniculis, tibiis apice tarsisque nigris, thorace nigro quadri punctato.

Assez large, brillant, pubescent de gris, testacé, yeux, antennes, genoux, sommet des tibias et tarses noirs, prothorax orné, sur le disque, de 4 petites macules noires disposées deux à deux. Tête carrée derrière les yeux, fortement ponctuée ; prothorax court, peu élargi en avant du milieu, un peu rétréci antérieurement, fortement et éparsément ponctué ; élytres un peu plus larges que le prothorax, subparallèles, pas très longs, irrégulièrement ponctués ; pattes robustes, tibias un peu arqués. Long. 7 mill. République Argentine : Rio Salado.

Voisin de *N. gibbifrons* Guer., mais tête différente et prothorax orné de macules noires.

Nemognatha Claveri n. sp. Satis latus, nitidus, supra testaceus, infra niger, oculis, antennis pedibusque nigris.

Assez large, brillant, orné de quelques poils courts dressés, testacé en dessus, noir en dessous et sur les membres. Tête large, creusée entre les yeux, impressionnée sur le milieu du vertex et de chaque côté, présentant postérieurement quatre fortes gibbosités ; prothorax de la largeur de la tête, transversal, peu élargi en avant, non rétréci antérieurement, inégal et impressionné en dessus, sinué postérieurement, à ponctuation forte et écartée ; élytres un peu plus larges que le prothorax, faiblement rétrécis au milieu, assez longs, finement et densément ponctués ; pattes assez robustes. Long. 13 mill. Colombie, Ibague (F. Claver).

Voisin de *N. gibbifrons* Guer., mais la tête est quadrigibbeuse postérieurement, impressionnée au milieu du vertex et la coloration des pattes est entièrement foncée.

Nemognatha cherenensis n. sp. Satis elongatus, nitidus, testaceus, oculis, antennis, articulo 1° rufo excepto, tarsis pectoreque nigris, elytris testaceis, apice breve nigro notato.

Assez allongé, brillant, médiocrement pubescent de gris, testacé avec les yeux, les antennes, sauf le 1er article qui est roux, les tarses et tout le milieu du dessous du corps, noirs. Tête large, à tempes bien marquées, fortement ponctuée, sillonnée longitudinalement et brièvement maculée de brun entre les yeux ; antennes assez grêles, subfiliformes ; prothorax transversal, élargi antérieurement, impressionné en dessus, fortement et éparsément ponctué ; élytres un peu plus larges que le prothorax, subparallèles, assez finement ponctués, testacés, brièvement maculés de noir au sommet. Long. 10 mill. Erythrée : Cheren.

Voisin de *N. sinuatipennis* Pic, dont il a la coloration, mais élytres de structure différente et plus brièvement marqués de noir au sommet ; il est moins allongé que *N. innotaticeps* Pic et le prothorax est plus élargi antérieurement.

Coryna 12-punctata v. nov. **iringana**. Elytris ante apicem testaceo fasciatis, thorace nitidissimo.

Cette variété se distingue de la forme type par les macules postérieures des élytres réunies deux à deux en forme de bande sur chacun de ces organes et par le prothorax très brillant. Afrique orientale allemande : Iringa.

Decatoma Crampeli n. sp. Elongatus, subnitidus, argenteo pubescens, niger, elytris antice et lateraliter late posticeque bi et breve testaceo notatis.

Allongé, à peine brillant, orné d'une pubescence argentée, noir avec chaque élytre orné des dessins testacés suivants : une grande macule antérieure externe, entamée en avant par les épaules restant noires, un peu élargie en se rapprochant de la suture, puis échancrée vers les côtés postérieurement (parfois cette macule est longitudinalement divisée et envahie par la coloration noire, c'est alors la var. nov. *bisbidisjuncta*) et en dessous du milieu de deux macules, l'interne plus grande, éloignée de la suture, l'externe touchant le bord externe. Long. 10 mill. Congo français : Fort Crampel. Acquis de Le Moult.

Voisin de *D. Maindroni* Pic, mais la grande macule antérieure testacée est plus longue et autrement échancrée postérieurement.

Bruchus (Callosobruchus) Maindroni n. sp. Latus, antice attenuatus, rufus, oculis nigris, elytris nigro- et albo maculatis, femoribus posticis dentatis.

Large, atténué en avant, en partie pubescent de blanc ou jaune, roux avec les yeux noirs, membres testacés, élytres ornés, sur les intervalles alternes, de macules allongées noires et de quelques lignes blanches et prothorax offrant de vagues macules brunâtres. Tête carénée entre les yeux, antennes fortement dentées à partir du 4e article ; prothorax conique, très rétréci en avant, inégal en dessus avec deux callosités basales blanches ; écusson revêtu de poils blancs ; élytres assez larges et courts, à épaules arrondies, striés-ponctués ; pattes testacées, postérieures épaisses avec les

cuisses munies d'une forte dent. Long. 3 mill. Indes : Coonour (ex Maindron).

Cette jolie petite espèce peut prendre place près de *B. malaccanus* Pic, dont elle se distingue, à première vue, par les élytres moins courts et la coloration plus claire.

Bruchus dilaticornis n. sp. Minutus, oblongus, sat dense albido aut griseo pubescens, niger, antennis ad basin, femoribus tibiisque anticis et intermediis testaceis ; antennis validis, femoribus posticis simplicibus.

Petit, oblong, assez densément revêtu de pubescence grise ou blanche, ruguleusement ponctué, noir avec les 3 premiers articles des antennes, les 4 cuisses et tibias antérieurs ou intermédiaires testacés. Tête longue ; antennes longues et très robustes avec les premiers articles moins larges ; prothorax long, conique, très rétréci en avant ; élytres un peu plus larges que le prothorax, assez courts, striés ; pattes postérieures noires, assez robustes avec les cuisses inermes. Long. près de 2 mill. Sénégal.

Paraît voisin de *B. nigritarsis* Fairm., la coloration du corps serait plus foncée et les antennes plus épaisses.

Glenea Fortunei v. nov. **pubescens**. Elytris dense griseo-viridescente pubescentibus.

Cette variété est caractérisée par la pubescence dense, d'un gris verdâtre, qui recouvre les élytres en voilant la coloration foncière noire. Chine.

Glenea Fortunei v. nov. **notatipennis**. Maculis nigris, elytrorum signaturis viridescentibus ornatis.

Chez cette variété les grandes macules noires des élytres sont ornées de petites macules faites de pubescence verdâtre. Chine.

Megascelis cæruleipennis n. sp. Robustus, nitidus, griseo pubescens, niger, elytris cærulescentibus, capite, thorace scutelloque testaceis.

Robuste, brillant, orné d'une pubescence grise argentée, noir en dessous et sur les membres, sauf les pattes antérieures en partie roussâtres, élytres bleuâtres, écusson,

tête et prothorax testacés, à reflets métalliques verdâtres. Tête impressionnée entre les yeux, à ponctuation forte et écartée, sillonnée sur le vertex ; prothorax presque carré, fortement ponctué, impressionné sur le milieu ; élytres larges et courts, à stries faibles ponctuées de gros points rapprochés avec de petites rides transversales. Long. 6 mill. Brésil : Sao Paulo (Gounelle).

Voisin de *M. mexicana* Jac. (ex description), coloration du dessous et des pattes plus foncée, prothorax non ruguleux.

Megascelis semiviridis n. sp. Robustus, nitidus, mediocre griseo pubescens, testaceus, elytris viridi-metallicis, oculis antennisque pro majore parte nigris.

Robuste, brillant, modérément pubescent de gris, testacé avec des reflets métalliques verdâtres sur l'avant-corps, élytres verts, yeux et majeure partie des antennes noires. Tête sillonnée sur le vertex, finement et éparsément ponctuée ; prothorax peu plus long que large, fortement ponctué, faiblement impressionné sur le milieu ; élytres larges et courts, à faibles stries ponctuées de gros points rapprochés avec de petites rides transversales. Long. 6 mill. Cayenne.

Diffère du précédent, en outre de la coloration testacée du dessous, par la tête moins fortement ponctuée et les élytres plus brillants.

Descriptions abrégées de Malacodermes et Hétéromères

Calochromus multicostatus n. sp. Elongatus, nitidus, nigro-cærulescens, thorace, scutello, humeris infra, coxis anticis et intermediis rufo-testaceis ; thorace transverso, diverse impresso, elytris multicostatis. Long. 12 mill. Ceram.

Voisin de *C. glaucopterus* Guer., mais élytres foncés avec des côtes plus régulières.

Trypherus ruficollis n. sp. Satis elongatus, nitidus, niger, thorace rufescente, antennis ad basin, femoribus pro parte pallido testaceis, abdomine nigro, flavo limbato, elytris nigris, apice oblique luteo maculatis. Long. 5 mill. Brésil.

Voisin de *T. elongatus* Pic, moins allongé, abdomen plus foncé, prothorax de coloration moins claire, etc.

Trypherus trimaculatus n. sp. Grandis, elongatus, fere opacus, niger, infra corpore pro majore parte, capite antice, luteo-testaceis, thorace luteo-testaceo, in disco nigro trimaculato (macula media minuta, externis arcuatis), elytris nigris, apice late luteo-testaceo notatis. Long. 10-11 mill. Mexique : Jalapa.

Diffère, à première vue, de *T. forficulinus* Gorh. par le prothorax orné de 3 macules noires.

Trypherus mapirianus n. sp. Elongatus, subnitidus, rufo-brunneus, capite obscuriore, articulis primis antennarum, femoribus ad basin, abdomine pro parte testaceis, elytris apice late flavo-testaceis. Long. 5 mill. Bolivie : Mapiri.

Diffère de *T. plicatipennis var. ruficeps* Pic par la forme plus étroite, les élytres plus déhiscents et de coloration différente.

Trypherus albomaculatus n. sp. Satis angustatus, nitidus, niger, articulis 2 primis antennarum et femoribus ad basin late testaceis, elytris nigris, apice late albo maculatis. Long. 5 mill. Bolivie : Mapiri.

Très voisin de *T. plicatipennis* Pic, en diffère, à première vue, par les élytres non plissés et blancs, au lieu d'être jaunes, au sommet.

Belotus albonotatus n. sp. Elongatus, nitidus, niger, articulis 2 primis antennarum testaceis, abdomine albo limbato, elytris nigris, apice late albo maculatis. Long. 4,5 mill. Bolivie : Mapiri.

Coloration de l'espèce précédente, mais prothorax de structure différente, presque droit sur les côtés avec les

angles postérieurs peu marqués, la tête à peine creusée entre les yeux, les pattes plus grêles, etc. Peut se placer près de *B. abdominalis* Lec. dont il se distingue nettement par la forme étroite et la coloration.

Belotus brevenotatus n. sp. Satis elongatus, nitidus, niger, abdomine pro parte flavo, elytris nigro-piceis, apice breve flavo notatis. Long. 7 mill. Brésil.

Diffère nettement de *B. abdominalis* Lec. par le prothorax entièrement foncé et la macule apicale des élytres plus petite et plus pâle.

Discodon maculaticeps n. sp. Modice elongatus, nitidus, niger, antennis ad basin, femoribus anticis pro parte testaceis, capite, in vertice nigro maculato, thoraceque testaceis, elytris nigro-violaceis, rugulosis. Long. 8 mill. Pérou.

Voisin de *D. testaceicorne* Pic, en diffère par les élytres violacés, les antennes foncées, le prothorax immaculé, etc.

Discodon bogotense n. sp. Elongatus, nitidus, niger, capite, thorace, scutello, antennis ad basin femoribusque pro parte testaceis, elytris nigro-cæruleis. Long. 9 mill. Bogota.

Voisin de *D. cordubense* Berg, en diffère par la forme plus allongée, l'écusson et partie des cuisses testacés.

Discodon sangosium n. sp. Satis elongatus, nitidus, oculis elytrisque nigris. Long. 10 mill. Bolivie : Sango.

Diffère du précédent, en outre de la coloration différente, par la forme moins étroite et le prothorax plus transversal.

Silis teffensis n. sp. ♂ Satis elongatus, subparallelus, nitidus, niger, capite antice, articulis primis antennarum pro parte, thorace (in medio nigro lineato), femoribus, tibiis abdomineque ad basin testaceis. Thorace lato, postice lobato et late bidentato. Long. 4,5 mill. Amazones : Teffe.

Peut se placer près de *S. subimpressa* Pic, le prothorax est différent, présentant antérieurement deux lobes courts et orné d'une bande noire, les élytres sont plus allongés, etc.

Attalus discomaculatus n. sp. Oblongus, postice dilatatus, subnitidus, niger, antennis ad basin thoraceque testaceis, illo in disco nigro notato ; elytris nigris, ad medium et apice testaceo maculatis. Long. 2,5 mill. Indes.

Voisin de *A. niponensis* Pic, de forme un peu moins allongée avec les élytres maculés de testacé.

Attalus apicipennis n. sp. Elongatus, postice dilatatus, subnitidus, niger, capite antice, thorace, antennis ad basin pedibusque pro parte testaceis, abdomine testaceo marginato, elytris nigro-subcyaneis, apice breve flavo notatis. Long. 3 mill. Indes.

Voisin de *A. niponensis* Pic, mais élytres marqués de clair à l'extrémité et tête testacée devant les yeux.

? **Ebaeus guadeloupensis** n. sp. Brevis et latus, apice dilatatus, nitidus, fere impunctatus, nigro-cyaneus, antennis ad basin testaceis. Long. 2 mill. Guadeloupe.

Ressemble à ? *E. bahiensis* Pic, mais plus bleu avec les pattes postérieures foncées.

Mastilius maculosus n. sp. Elongatus, nitidus, griseo pubescens, niger, capite antice, antennis, pedibus pro majore parte, scutello elytrisque testaceis, his nigro multi maculatis et sinuato fasciatis. Long. 5 mill. Madagascar : Majunga.

Cette espèce est très différente de celles connues du genre par les élytres qui sont ornés de nombreuses petites macules ou fascies étroites, sinuées, de coloration noire.

Xamerpus luteofasciatus n. sp. Robustus, nitidus, metallicus, viridis, elytris cæruleis, ante medium et in disco luteo fasciatis, antennis ad basin pedibusque testaceis. Long. 3 mill. Madagascar.

Cette espèce diffère de *X. Martini* Frm., en outre de la coloration différente, par les élytres plus explanés vers les épaules.

Phobelius tuberculatus n. sp. Oblongo-ovatus, postice ampliatus et subconicus, niger, elytris æneis, subs-

triatis, distincte tuberculatis. Long. 8 mill. Brésil : Espirito-Santo.

Cette espèce est distincte entre toutes par les élytres fortement tuberculés, les tubercules étant plus rapprochés sur les côtés du disque.

Phobelius semibrunneus n. sp. Oblongo-ovatus postice ampliatus et subacuminatus, niger, elytris brunneis, striatis et costulatis, postice mediocre granulatis. Long. 8 mill. Brésil : Jatahy.

Diffère du précédent par les élytres non fortement tuberculés mais simplement granulés postérieurement. A placer près de *P. lucifugus* Frm.

Talanus Gounellei n. sp. Mediocre elongatus, nitidus, niger, antennis tarsisque testaceis, elytris cupreo-metallicis, satis latis, parallelis, apice attenuatis, distincte striatis et profunde punctatis, interstitiis angustatis, subconvexis. Long. 6 mill. Brésil : Pery-Pery (Gounelle).

Cette espèce se distingue facilement par sa forme élytrale large, ces organes étant fortement ponctués et de coloration cuivreuse. A placer près de *T. brasiliensis* Makl.

Talanus subacuminatus n. sp. Modice elongatus, nitidus, rufescens, thorace in disco obcuriore, elytris satis latis, apice subacuminatis, profonde striatis et mediocre punctatis, interstitiis convexis, angustatis. Long. 7 mill. Brésil : Goyas.

Voisin de *T. brasiliensis* Makl. mais interstries plus étroits et élytres subconvexes au sommet.

Talanus guyanensis n. sp. Satis elongatus, nitidus, niger, elytris nigro-œneis, his satis latis, parallelis, profonde striatis et mediocre punctatis, interstitiis convexis, angustatis. Long. 5 mill. Guyane Française (Le Moult).

Diffère du précédent par la coloration plus foncée, les élytres plus parallèles, etc. Sans doute voisin de *T. ater* Chp. dont il diffère au moins par les interstries convexes.

Talanus obscuriceps n. sp. Modice elongatus, nitidus, rufescens, capite obscuriore, elytris satis latis, paral-

lelis, apice attenuatis, profonde striatis et mediocre punctatis, interstitiis satis latis, subconvexis. Long. 8 mill. Colombie.

Paraît voisin de *T. humilis* Makl. et en diffère au moins par la tête noire. Diffère, en outre, de *T. subacuminatus* mihi par le prothorax moins étroit et nettement sinué vers les angles postérieurs, les élytres à ponctuation plus distincte.

Talanus rufipennis n. sp. Satis latus, modice elongatus, nitidus, rufescens, vertice brunnescente, elytris satis latis, subparallelis, apice attenuatis, minute striatis, fere impunctatis, interstitiis latis, deplanatis. Long. 6 mill. Brésil.

Cette espèce est très distincte par sa ponctuation allongée, à peine marquée sur les stries ponctuées, celles-ci faibles avec des intervalles larges et plats ; peut se placer près de *T. lævipennis* Chp.

Cyriogeton convexum n. sp. Ovatus (1), valde convexus, apice attenuatus, nitidus, niger, thorace, scutello elytrisque viridibus aut cæruleis ; elytris læviter punctato striatis. Long. 16 mill. Chine : Hong-Kong.

Voisin de *C. tonkinense* Frm. mais dessous noir et élytres bleus.

Cyriogeton semicupreum n. sp. Oblongus, subconvexus, nitidus, viridi-metallicus, supra pro parte cupreus ; elytris instriatis, disperse sat sparse punctatis. Long. 17 mill. Tonkin.

Diffère de *C. insignis* Pascoe, mais coloration et ponctuation différente sur les élytres.

Cyriogeton latum n. sp. Latus, postice attenuatus, nitidus, nigro-æneus, elytris minute lineato punctatis. Long. 22 mill. Indes : Nepaul.

.....

(1) Pour conserver un cachet d'uniformité à mes diagnoses, je les ai toutes rédigées (que le nom générique soit neutre ou féminin) au masculin. Il faut sous-entendre, dans ces descriptions, le mot *insectus* ; nous avons donc ainsi : Insectus ovatus, etc.

Très distinct de l'espèce précédente par la forme plus élargie, les élytres ayant des rangées très distinctes de petits points avec les intervalles larges, presque imponctués.

Cyriogeton Donckieri n. sp. Oblongo-ovatus, postice attenuatus, nitidus, nigro-æneus, elytris minutissime lineato punctatis. Long. 16 mill. Chine : Yunnan (ex Donckier).

De forme un peu plus allongée que le précédent avec les rangées de points plus faibles sur les élytres.

Plesiophthalmus cæruleus n. sp. Oblongo-ovatus, satis elongatus, postice attenuatus, cæruleus, femoribus ad basin late testaceis ; elytris punctato striatis ; thorace parum lato, antice attenuato, fortiter sat dense punctato. Long. 15 mill. Tonkin.

Cette espèce, très distincte par sa coloration bleue, prend place près de *P. pallidicrus* Frm. dont elle offre une coloration analogue sur les cuisses.

Plesiophthalmus bicoloripes n. sp. Oblongo-ovatus, postice attenuatus, nitidus, nigro-subæneus, femoribus ad medium late luteis ; elytris minute lineato-punctatis ; thorace sat lato, minutissime sat sparse punctato. Long. 15 mill. Chine : Yunnan.

De forme plus élargie que l'espèce précédente avec la coloration différente, les cuisses noires à leur base, en outre de leur sommet.

Hypophloeus angustatus n. sp. Angustatus, nitidus, alutaceus et sat fortiter punctatus, niger, antennis, tibiis tarsisque rufescentibus, elytris nigris, ad humeros, ad suturam et apice rufescentibus ; antennis latis ; thorace longissimo, subparallelo, fortiter sat sparse punctato ; elytris longis, parallelis, substriatis. Long. 9 mill. Madagascar (ex Sikora).

A placer près de *H. ephippiatus* Frm. et distinct, à première vue, par sa coloration.

Hypophloeus nitidissimus n. sp. Elongatus, nitidissimus, niger, antennis apice tarsisque testaceis, minute

sat sparse punctatus, thorace postice valde attenuato, elytris parallelis, instriatis. Long. 3 mill. Congo : Benito.

Voisin de *H. teredoides* Frm., mais ponctuation espacée, prothorax très rétréci postérieurement, etc.

Hypophloeus insellatus n. sp. Elongatus, parallelus, nitidus, alutaceus et mediocre punctatus, rufus, elytris pedibusque pallidioribus ; antennis validis ; thorace antice mediocre dilatato, fortiter sat sparse punctato ; elytris parallelis, fere instriatis, lineato et mediocre punctatis. Long. 6 mill. Madagascar (Sikora).

Voisin de *H. rufosellatus* Frm. et distinct à 1re vue par la coloration entièrement testacée des élytres et la ponctuation moins écartée du prothorax.

Hypophloeus Mocquerysi n. sp. Robustus, subparallelus, nitidus, pro parte rufus, pro parte nigro-piceus, elytris post humeris et lateraliter longe rufo notatis, pedibus testaceis ; elytris punctato striatis. Long. 5 mill. Gabon (Mocquerys).

Cette espèce se distingue facilement par sa forme robuste et le dessin des élytres.

Hypophloeus luteomaculatus n. sp. Elongatus, subparallelus, nitidus, elytris ad humeros et postmedium late luteo maculatis. Long. 3 mill. Indes.

Cette espèce se distingue entre toutes par ses élytres bimaculés de jaune.

Hypophloeus abyssinicus n. sp. Elongatus, subparallelus, nitidus, rufus, mediocre sat dense punctatus ; antennis validis ; thorace longo, subparallelo ; elytris elongatis, fere indistincte striatis, mediocre sat dense punctatis. Long. 7 mill. Abyssinie.

Peut se placer près de *H. ebeninus* Frm., de coloration plus claire, prothorax presque parallèle, etc.

Hypophloeus meridanus n. sp. Elongatus, nitidus, rufus, pedibus pallidioribus, alutaceus et sparse punctatus, thorace elongato, subparallelo ; elytris elongatis, substriato punctatis. Long. 5 mill. Vénézuela : Mérida.

Moins brillant, plus fortement et moins densément ponctué que le précédent.

Hypophloeus semiobscurus n. sp. Elongatus, nitidus, minute punctatus, nigro-piceus, elytris pedibusque pallidioribus ; antennis satis validis, thorace elongato, postice subattenuato ; elytris subparallelis, apice minute attenuatis. Long. 6 mill. Celèbes.

Par son système de coloration se rapproche de *H. longicollis* Frm.

Hypophloeus borneensis n. sp. Elongatus, nitidus, minime sat sparse punctatus, rufus, pedibus pallidioribus ; thorace parum elongato, fere recto, angulis anticis prominulis ; elytris fere instriatis, lineato punctatis. Long. 5-5,6 mill. Bornéo.

Antennes plus courtes, prothorax moins long que chez l'espèce précédente.

Hypophloeus sumatrensis n. sp. Elongatus, nitidus, mediocre testaceus ; thorace satis lato, subparallelo, mediocre sat sparse punctatus ; elytris elongatis, lineato mediocre sat dense punctatis. Long. 3 mill. Sumatra.

Diffère du précédent par la forme plus étroite, la ponctuation du prothorax plus forte que celle des élytres.

Hypophloeus niasensis n. sp. Elongatus, nitidus, mediocre sat sparse punctatus, rufus. Long. 3 mill. Ile Nias.

Diffère du précédent par les élytres moins larges par rapport au prothorax.

Hypophloeus cornutus n. sp. Elongatus, nitidus, subparallelus, rufus, antennis nigris ; capite in fronte breve bicornuto. Long. 3,5 mill. Malacca.

Cette espèee, par sa tête munie de 2 petites cornes, est très facile à reconnaître.

Lanthanus brasiliensis n. sp. Latus, nitidus, nigro-metallicus, elytris rufescentibus, antennis ad basin (articulis 3 ultimis antennarum nigris et latis) pedibusque testaceis. Long. 2 mill. Brésil.

Voisin de *L. latissimus* Pic, mais coloration différente des élytres, prothorax plus éparsément ponctué, à faible dépression basale.

Lanthanus albonotatus n. sp. Oblongus, nitidus, niger aut viridescens, rostro, antennis ad basin pedibusque pro parte rufescentibus, elytris ad humeros et post medium albo maculatis. Long. 2 mill. Ile Key.

Voisin de *L. variegatus* Chp. avec les macules claires des élytres réduites, la 1re étant plus près des épaules, le prothorax verdâtre, fortement impressionné de chaque côté de la base.

Lanthanus Rouyeri n. sp. Oblongus, nitidus, nigro-viridescens, antennis ad basin pedibusque pro parte testaceis, elytris ad humeros et postmedium late albo maculatis. Long. 3 mill. 5. Java (ex Rouyer).

Distinct du précédent par les antennes presque entièrement noires, le rostre plus court, le prothorax moins impressionné sur la base.

Pseudopyrochroa depressa n. sp. Satis latus, deplanatus, niger, elytris purpureis, capite antice mediocre impresso, antennis satis validis, flabellatis ; thorace lateraliter arcuato, in disco multi impresso ; elytris latis, postice dilatatis, subcostulatis. Long. 12 mill. Formose : Fainan.

Ressemble à *P. vestiflua* Lewis avec le prothorax moins large, les élytres plus déprimés.

Pseudopyrochroa lineaticollis n. sp. Elongatus, postice dilatatus, niger, elytris thoraceque purpureis, illo in medio nigro lineato, lateraliter arcuato ; capite antice excavato ; antennis validis ; elytris postice dilatatis, subcostulatis. Long. 11 mill. Thibet.

Diffère de *P. fainanensis* Pic, par les élytres moins parallèles, le prothorax moins transversal, orné d'une bande médiane noire

Eutrapela obscura n. sp. Satis elongatus, nitidus, nigro-subæneus, antennis pedibusque nigris ; thorace subquadrato, disperse punctato ; elytris substriatis, pro

parte irregulariter punctatis. Long. 8 mill. Afrique orientale anglaise.

Par sa coloration foncée se rapproche de *E. unicolor* Makl. mais avec des reflets bronzés et une ponctuation tout autre.

Eutrapela brevipennis n. sp. Satis latus, nitidus, niger, pro parte viridescens, thorace postice breve elytrisque pallido testaceis, thorace fere quadrato, disperse punctato ; elytris substriatis, pro parte irregulariter punctatis. Long, 7 mill. Afrique orientale allemande.

Diffère du précédent, en outre de la coloration, par le prothorax plus fortement ponctué, subarrondi en avant et les élytres de forme relativement courte, moins rétrécis au sommet.

Lophophyllus multicostatus n. sp. Parum nitidus, niger, elytris subcupreis, thorace fere quadrato, disperse punctato ; elytris multi costatis, intervallis late punctatis et plicatis. Long. 9 mill. Madagascar.

Voisin de *L. rugicollis* Frm., distinct, à première vue, par toutes les côtes des élytres semblables.

Lophophyllus nigromaculatus n. sp. Parum nitidus, niger, elytris subcupreis, thorace testaceo, postice nigro limbato et in disco lateraliter nigro notato, illo subquadrato, postice strangulato et inciso, disperse punctato, elytris multi costatis, intervallis late punctatis et plicatis, Long. 10 mill. Madagascar.

Diffère de *L. maculicollis* Frm. par la forme du prothorax et le devant de la tête foncé.

Uroplatopsis atripennis n. sp. ♀ . Elongatus, niger, thorace lateraliter rufo marginato, femoribus ad basin testaceis. Long. 12 mill. Guyane Française.

Voisin de *U. Le Moulti* Pic, en diffère par la tête plus foncée, le prothorax fortement creusé au milieu, les élytres entièrement foncés.

Statira flavovittata n. sp. Elongatus, nitidissimus,

mediocre punctatus, niger, elytris in disco, ad basin ultra medium, flavo vittatis, elytris pro parte minute lineato punctatis. Long. 5 mill. Brésil.

Voisin de *S. atricollis* Pic, élytres plus allongés avec la bande plus claire et partant de leur base.

Statira purpureipennis n. sp. Elongatus, niger, elytris nitidis, purpureis, abdomine apice rufescente ; capite thoraceque opacis, densissime punctatis ; elytris punctato-striatis et tuberculatis, pilis sparse ornatis. Long. 11-12 mill. Brésil : Jatahy.

Voisin de *S. rubrithorax* Pic, forme moins étroite et coloration très différente.

Statira interruptecostata n. sp. Satis elongatus, nitidus, nigro-piceus, antennis pedibusque pro parte rufescentibus ; thorace parum dense punctato, supra impresso ; elytris costatis, costis alternis interruptis, intervallis punctatis. Long. 12 mill. Guyane Française.

Voisin, par sa sculpture élytrale, de *S. catenata* Makl, avec une coloration plus foncée.

Statiropsis angustata n. sp. Elongatus, postice attenuatus, nitidus, nigro-subœneus, antennis pedibusque nigris, femoribus tibiisque ad basin rufescentibus. Long. 5 mill. Brésil : Caraça (Gounelle).

Diffère de *S. ænea* Borch. par la forme plus étroite et les élytres nettement rétrécis à l'extrémité.

Formicomus Vitalisi n. sp. ♀. Oblongus, nitidus, nigro-piceus, elytris obscurioribus, antennis ad basin femoribusque ad coxis testaceis. Long. 3 mill. environ. Cambodge : Kompong Kedey (ex Vitalis).

Voisin de *T. judex* Laf., mais antennes bicolores, tête obconique, élytres de forme différente, c'est-à-dire subovalaires, assez larges avec les épaules marquées, subarrondis au sommet.

Pseudoleptaleus malaccanus n. sp. Oblongus, nitidus, rufescens, antennis pro majore parte, abdomine

elytrisque nigris, his ad basin testaceo fasciatis. Long. près de 3 mill. Malacca (Doherty).

Voisin de *P. centurio* Mars., mais distinct à première vue par le prothorax dont le lobe postérieur n'est pas bituberculé mais saillant en dessus en gibbosité nette.

Pseudoleptaleus testaceomaculatus n. sp. Oblongus, nitidus, niger, femoribus pro parte testaceis, elytris antice testaceo maculatis. Long. 3 mill. Indes : Pégu.

Peut se placer près de *P. sumatræ* Pic, dont il rappelle la coloration : la macule des élytres est différente et le prothorax autrement conformé, celui-ci ayant le lobe antérieur fortement dilaté-arrondi, le postérieur un peu élevé et bituberculé.

Pseudoleptaleus caracasensis n. sp. Oblongus, nitidus, nigro-piceus, antennis femoribusque ad basin testaceis, elytris antice testaceo fasciatis. Long. 2,5 mill. Vénézuela : Caracas.

Voisin de *P. albicinctus* Laf. mais tête à ponctuation forte, plus écartée postérieurement.

Anthicus impressiceps n. sp. Oblongus, satis latus, nitidus, rufo-testaceus, antennis pedibusque pallidioribus, elytris postmedium late nigro fasciatis et apice breve nigro maculatis ; capite in vertice impresso ; thorace antice valde dilatato-rotundato ; elytris latis, fortiter sat sparse punctatis Long. près de 3 mill. Tonkin.

Ressemble à *A. monstrosicornis* Mars., mais antennes simples et tête fortement impressionnée sur le vertex.

Anthicus kuluensis n. sp. Oblongus, satis elongatus, nitidus, niger, thorace postice elytrisque pro parte rufescentibus, antennis pedibusque testaceis, femoribus brunneis. Long. 3 mill. Kulu dans l'Himalaya.

Voisin de *A. assamensis* Pic, mais plus allongé avec les élytres subparallèles, à peine plus foncés au milieu qu'aux extrémités.

TABLE

POUR LE ONZIÈME FASCICULE

Pages.

Introduction 1

Nouveau genre, espèces et variétés nouvelles de diverses familles. 2

Descriptions abrégées de Malacodermes et Hétéromères. . 8